

Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeut*innen

Prof. Dr. Noemi Kurt
FB 12, Institut für Mathematik, Goethe-Universität Frankfurt

Sommersemester 2023

Vorlesung 8

Inhalt

- ▶ Ableitung, Kettenregel
- ▶ Extremwerte, Kurvendiskussion

Lernziele

- ▶ Die Ableitungsregeln, insbesondere die Kettenregel, anwenden können
- ▶ Den Zusammenhang zwischen Ableitung und Eigenschaften der Funktion kenne
- ▶ Extremwerte bestimmen können

Benötigte Vorkenntnisse

- ▶ Funktionen, Ableitung, Ableitungsregeln

Differenzierbarkeit

Definition Eine Funktion f ist an der Stelle $a \in D(f)$ differenzierbar, falls der Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$$

existiert. Ist f in allen Punkten einer Menge M differenzierbar, so heißt f differenzierbar in M . Ist f in allen Punkten seines Definitionsbereichs differenzierbar, so heißt f differenzierbar.

- ▶ $f'(a)$ definiert als der obige Grenzwert heißt **Ableitung** von f in a . Für differenzierbares f ist die Funktion f' die Ableitung.
- ▶ $f'(a)$ entspricht der **Steigung** oder lokalen Veränderung der Funktion f im Punkt a .
- ▶ $f''(a)$ definiert als Ableitung von f' (sofern diese existiert) ist die zweite Ableitung, sie entspricht der **Krümmung** von f in a .

Ableitungen wichtiger Funktionenklassen

- ▶ Geraden: $f(x) = ax + b$, dann ist $f'(x) = a$.
- ▶ Konstanten: $f(x) = c$, dann ist $f'(x) = 0$.
- ▶ Potenzen: $f(x) = a \cdot x^n$, dann ist $f'(x) = a \cdot n \cdot x^{n-1}$.
- ▶ $(e^x)' = e^x$
- ▶ $(\ln x)' = \frac{1}{x}$
- ▶ $(\sin x)' = \cos x$
- ▶ $(\cos x)' = -\sin x$

Ableitungsregeln

Produktregel Seien f und g differenzierbar. Dann ist $f \cdot g$ differenzierbar, mit

$$(f \cdot g)'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x).$$

Beispiele an der Tafel

Quotientenregel Seien f und g differenzierbar. Falls $g(x) \neq 0$ ist, so ist $\frac{f}{g}$ in x differenzierbar, mit

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}.$$

Beispiele an der Tafel

Kettenregel

Seien h und g differenzierbar. Dann ist

$$f(x) = g(h(x))$$

differenzierbar, mit

$$f'(x) = g'(h(x)) \cdot h'(x).$$

Dabei nennt man g' die äußere Ableitung, h' die innere Ableitung.

Beispiele an der Tafel.

Anwendung der Kettenregel

- ▶ $(a^x)' = a^x \ln a$
- ▶ $(f(x)^{g(x)})' = f(x)^{g(x)} \cdot (g(x) \ln f(x))'$

Extremwerte

Sei f eine Funktion, und a ein Punkt aus dem Definitionsbereich von f .

- ▶ f hat in a ein lokales **Minimum**, falls $f(a) \leq f(x)$ für alle x in einer kleinen Umgebung von a gilt.
- ▶ f hat in a ein lokales **Maximum**, falls $f(a) \geq f(x)$ für alle x in einer kleinen Umgebung von a gilt.
- ▶ Umgebung bedeutet dabei die Menge aller x , so dass der Abstand von x zu a kleiner als eine feste Zahl $\varepsilon > 0$ ist.
- ▶ (Bild an der Tafel)
- ▶ Bei einem Maximum **wächst** f links von a und **fällt** rechts von a .
- ▶ Umgekehrt bei einem Minimum.
- ▶ Somit ändert die Steigung f' in a das Vorzeichen, es gilt als $f'(a) = 0$.

Hinreichendes Kriterium für Extrema

(Satz) Es sei f zweimal differenzierbar, mit $f'(a) = 0$.

- ▶ Ist $f''(a) < 0$, so hat f in a ein lokales Maximum
- ▶ Ist $f''(a) > 0$, so hat f in a ein lokales Minimum.

Falls $f''(a) = 0$ ist, sind weitere Untersuchungen notwendig.

Ein Punkt a in dem $f'(a) = 0$ ist, heißt **kritischer Punkt**.

(Beispiele an der Tafel)